Trois Lycides exotiques nouveaux [Col.]

par Maurice Pic.

Coloberos longipennis, n. sp. — *Elongatus, fere opacus, nigropiceus, elytris rubro-testaceis; antennis validis; thorace brevi, inaequali; elytris subparallelis, costatis, intervallis subquadratis.*

Allongé, presque mat, modérément pubescent de flave ou de gris, noir de poix avec les élytres d'un rouge testacé. Tête assez large, impressionnée sur le vertex. Antennes noires, robustes, poilues, impressionnées en dessus, 2e article très court, emboîté dans le 1er, 3e long, plus long que le 4e, avant-derniers articles moins larges que les précédents, dernier long, étroit, cylindrique. Prothorax court et large, un peu retréci en avant, fortement impressionné transversalement sur le milieu, subsillonné longitudinalement sur sa partie basale. Écusson grand, foncé, roussâtre au sommet où il est arrondi. Élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, séparément arrondis au sommet, marqués de quatre côtes saillantes, en plus de la suture et du bord latéral élevés, les intervalles ayant des fossettes peu profondes, en majeure partie subcarrées et assez régulières; pattes aplaties. — Long. 7 mill.

Ceylan : Belihul-Oya (coll. Pic).

Cette espèce se distingue, à première vue, de *C. tenellus* Bourg. par la forme allongée du corps.

Libnetis maculithorax, n. sp. — *Elongatus, fere opacus, nigropiceus, scutello brunneo, thorace carinato, testaceo, in disco nigro notato, elytris testaceis, ad apicem late nigris.*

Allongé, presque mat, prothorax testacé, maculé de noir sur le disque de chaque côté de la carène médiane, écusson brun, élytres testacés, largement marqués de noir au sommet. Tête médiocre, foncée; parties buccales rousses. Antennes peu longues, atténuées à l'extrémité. Prothorax court, rétréci et subarqué en avant, bisinué en arrière, creusé de chaque côté de sa carène médiane. Écusson grand, tronqué au sommet. Élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles, séparément arrondis au sommet, marqués de côtes nettes, testacés sur un peu plus de la moitié basale, avec cette coloration prolongée étroitement en arrière sur la suture et le bord latéral, noirs sur la deuxième moitié. Pattes foncées, avec les hanches et genoux en partie testacés. — Long. 5,5 mill.

Malaisie : île Banguey (coll. Pic).

A placer près de *L. pallidipennis* Pic.; très distinct par ses élytres bicolores, son prothorax testacé et bimaculé de noir sur le disque, etc.

Scarelus testaceus, n. sp. — *Elongatus, subnitidus, testaceus, antennis brunnescentibus, oculis nigris; antennis longissimis, thorace carinato; elytris in disco bicostatis*

Allongé, peu brillant, éparsément pubescent de flave, testacé, avec les antennes rembrunies et les yeux noirs. Tête (avec les yeux) assez large. Antennes robustes, longues, dépassant les élytres de plusieurs articles, brunâtres avec les deux premiers articles testacés. Prothorax court, rétréci et subarqué en avant, rebordé, sinué postérieurement, caréné sur son milieu, la carène légèrement fendue au milieu. Écusson large, faiblement échancré au sommet. Élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, subacuminés au sommet, à bords latéral et sutural élevés et marqués, en outre, de 2 côtes dorsales, intervalles larges avec des impressions transversales simples, ou paraissant doubles. Pattes testacées. — Long. 5 mill.

Malaisie : île Banguey (coll. Pic).

Espèce voisine de *S. orbatus* Wat., très distincte par sa coloration et par la sculpture des élytres.

Synonymie de l'*Eurygaster hottentotta* Fabr. [Hem. Pentatomidae] et description d'une variété nouvelle

par le Dr Maurice Royer.

Ainsi que tous les *Eurygaster*, l'*E. hottentotta* Fabr. présente deux types extrêmes de coloration, l'un testacé terreux, l'autre noir ferrugineux, entre lesquels on trouve parfois des transitions. Les variétés extrêmes sont cependant assez tranchées pour justifier des désignations différentes. C'est ainsi que Fabricius, après avoir décrit en 1775 la forme foncée (*toto obscure ferrugineo*) de cette espèce sous le nom de *Cimex hottentotta*, a mis à part en 1798 la forme claire (*pallide testaceus*) sous le nom de *Cimex maroccanus*.

Les descriptions de Fabricius ne comportent pas d'ambiguïté; d'ailleurs, en 1868, Stål (Hemiptera Fabriciana, I, 12) déclare que d'après la collection de Fabricius « *Tetyra hottentotta varietas est obscura Tetyrae maroccanae* ».